








Grzyb *Coriolus versicolor* w walce z rakiem jelita grubego

<p>P POPULACJA</p> <p>7 BADAŃ </p> <p>1569 PACJENTÓW z rakiem jelita grubego</p> <p>2 KRAJE </p>	<p>I INTERWENCJA</p> <p>chemioterapia + wyciąg z grzyba <i>Coriolus versicolor</i> (tzw. polisacharyd Krestin, PSK)</p> 	<p>C CO PORÓWNUJEMY</p> <p>standardowa chemioterapia</p>
--	---	---

O CO PYTAMY

<p>1 Przeżycie (obserwacja w ciągu 5 lat)</p> <p>POŻĄDANY PUNKT KOŃCOWY 😊</p>	<p>chemioterapia + PSK może występować niewielka poprawa przeżywalności, ale nie jest to pewne</p> <p>⊕⊕○○ GRADE low </p>	<p>vs standardowa chemioterapia</p> <p>RR 1,08 (1,01 do 1,15)</p> 
<p>2 Wycofanie się z leczenia z powodu zdarzeń niepożądanych (obserwacja od 6 miesięcy do 5 lat)</p> <p>NIEPOŻĄDANY PUNKT KOŃCOWY 😞</p>	<p>chemioterapia + PSK nie ma pewności czy jest różnica</p> <p>⊕○○○ GRADE very low </p>	<p>vs standardowa chemioterapia</p> <p>RR 1,03 (0,45 do 2,34)</p> 

! DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

<p>3 Nudności (obserwacja od 4 tygodni do 7 lat)</p> <p>NIEPOŻĄDANY PUNKT KOŃCOWY 😞</p>	<p>chemioterapia + PSK nie ma pewności czy jest różnica</p> <p>⊕○○○ GRADE very low </p>	<p>vs standardowa chemioterapia</p> <p>RR 0,73 (0,44 do 1,22)</p> 
<p>4 Biegunka (obserwacja od 4 tygodni do 7 lat)</p> <p>NIEPOŻĄDANY PUNKT KOŃCOWY 😞</p>	<p>chemioterapia + PSK nie ma pewności czy jest różnica</p> <p>⊕○○○ GRADE very low </p>	<p>vs standardowa chemioterapia</p> <p>RR 0,77 (0,32 do 1,86)</p> 
<p>5 Zaburzenia w obrębie jamy ustnej (obserwacja od 6 miesięcy do 7 lat)</p> <p>NIEPOŻĄDANY PUNKT KOŃCOWY 😞</p>	<p>chemioterapia + PSK nie ma pewności czy jest różnica</p> <p>⊕○○○ GRADE very low </p>	<p>vs standardowa chemioterapia</p> <p>RR 0,37 (0,13 do 1,03)</p> 

WNIOSKI

Nie jest jasne czy dodanie wyciągu z grzyba *Coriolus versicolor* (PSK) miał jakikolwiek wpływ na liczbę pacjentów, u których leczenie musiało zostać przerwane z powodu działań niepożądanych. Dane naukowe były również niepewne co do tego, czy dodanie PSK do leczenia zmniejszyło ryzyko wystąpienia skutków ubocznych spowodowanych chemio- lub radioterapią. Dane naukowe o niskiej pewności wskazują na niewielki wpływ dodania do leczenia PSK na przeżycie po 5 latach, w porównaniu z leczeniem standardowym. Efekty przed upływem 5 lat nie były jednoznaczne.