




Baklofen w leczeniu uzależnienia od alkoholu

<p>P POPULACJA</p> <p>17 BADAŃ</p> <p>1818 UZALEŻNIONYCH</p> <p>9 KRAJÓW</p>	<p>I INTERWENCJA</p> <p>baklofen (30-300 mg dziennie)</p> 	<p>C CO PORÓWNUJEMY</p> <p>placebo</p>
--	---	---

O CO PYTAMY

<p>1 Powrót do picia po zakończeniu leczenia</p> <p>NIEPOŻĄDANY PUNKT KOŃCOWY 😞</p>	<p>baklofen vs placebo</p> <p>prawdopodobnie zmniejsza ryzyko powrotu do picia</p> <p>GRADE moderate</p> <p>👍</p>	<p>RR 0,87 (0,77 do 0,99)</p> 
<p>2 Spadek częstotliwości używania (mierzonej % dni abstynencji) pod koniec leczenia</p> <p>POŻĄDANY PUNKT KOŃCOWY 😊</p>	<p>baklofen vs placebo</p> <p>zwiększa odsetek dni abstynencji</p> <p>GRADE high</p> <p>👍</p>	<p>MD 9,07% (3,30% do 14,85%)</p> 
<p>3 Dzielne spożycie alkoholu po zakończeniu leczenia</p> <p>NIEPOŻĄDANY PUNKT KOŃCOWY 😞</p>	<p>baklofen vs placebo</p> <p>prawdopodobnie nie ma różnic</p> <p>GRADE moderate</p> <p>?</p>	<p></p>

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

<p>4 Liczba osób z przynajmniej 1 zdarzeniem niepożądanym po zakończeniu leczenia</p> <p>NIEPOŻĄDANY PUNKT KOŃCOWY 😞</p>	<p>baklofen vs placebo</p> <p>nie ma różnic</p> <p>GRADE high</p> <p>?</p>	<p>RR 1,05 (0,99 do 1,11)</p> 
<p>5 Rezygnacja z leczenia z powodu zdarzeń niepożądanych</p> <p>NIEPOŻĄDANY PUNKT KOŃCOWY 😞</p>	<p>baklofen vs placebo</p> <p>nie ma różnic</p> <p>GRADE high</p> <p>?</p>	<p>RR 1,39 (0,89 do 2,18)</p> 

WNIOSKI

Aktualne dane naukowe wskazują, że może on pomóc osobom uzależnionym od alkoholu w utrzymaniu abstynencji. Szczególnie osobom, które przeszły już detoksykację.